



3 - Le cancer du côlon-rectum en Mayenne

données mises à jour : juillet 2007

Tableau 1 - Admissions en affection de longue durée (1) - codes CIM10 : C18-C21

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nombre total d'admissions					102	118	128	134	118	144
Nombre d'admissions chez les 50-74 ans					50	57	64	73	53	80
Nombre d'admissions chez les 75 ans et plus					47	52	56	53	56	54

Tableau 2 - Mortalité - codes CIM9 : 153-154 ; CIM10 : C18-C21


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nombre total de décès	90	63	91	88	86	87	82	86	76	85
Taux moyen de mortalité standardisé (2) - Hommes	36,7	38,6	35,2	38,7	36,9	37,0	34,9	31,7		
Taux moyen de mortalité standardisé (2) - Femmes	16,9	17,7	19,4	20,0	18,9	16,7	18,0	17,4		

Sources : URCAM - DRSM Pays de la Loire, INSERM CépiDc, INSEE RP 90

Exploitation ORS

(1) données qui concernent les personnes protégées par le régime général, le régime agricole (MSA) et le régime des professions indépendantes (RSI)
 (2) taux pour 100 000 habitants standardisé sur la population française, moyenne sur les 3 années n-1, n, n+1

Figure 1 - Evolution du taux de mortalité (2) par cancer du côlon-rectum en Mayenne et en France métropolitaine depuis 1981



Sources : INSERM CépiDc, INSEE RP90

Exploitation ORS

3 - Le cancer du côlon-rectum en Mayenne

rédaction : mars 2006

Situation épidémiologique actuelle

- Pour le département de la Mayenne, il n'est pas possible de connaître de façon précise l'incidence du cancer du côlon-rectum, car il n'existe pas de registre des cancers dans ce département.

Les statistiques d'admissions en affection de longue durée (ALD) pour cancer du côlon-rectum, établies par l'URCAM et la DRSM pour les trois principaux régimes d'assurance maladie, constituent la seule source d'information disponible sur l'incidence. Selon ces données, 118 personnes ont été admises en ALD pour cette pathologie en 2003 en Mayenne (tableau 1 page 48).

- Chez les personnes de 50 à 74 ans, tranche d'âge concernée par le dépistage organisé, on dénombre 53 admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum en 2003, ce qui représente 45 % du nombre total de nouvelles admissions pour cette pathologie.

- Selon les statistiques annuelles de mortalité établies par l'Inserm CépiDc et disponibles jusqu'en 2002, le nombre de décès par cancer du côlon-rectum parmi les habitants de la Mayenne atteint 85 en moyenne chaque année pour la période 2000-2002 (tableau 2).

Tendances évolutives

- En Mayenne, le nombre de nouvelles admissions en affection de longue durée pour cancer du côlon-rectum a varié entre 102 et 134 sur la période 1999-2003.

L'évolution des admissions en ALD sur les années récentes doit être analysée avec prudence en raison du caractère médico-administratif de ces données. La mise en place en 2000 d'une nouvelle disposition tarifaire (majoration des honoraires pour les visites de patients de plus de 75 ans en ALD), a notamment pu inciter les praticiens à demander l'admission en ALD de certains patients n'en bénéficiant pas jusque-là, et contribuer ainsi à l'augmentation observée.

- L'évolution depuis le début des années 80 du taux standardisé de mortalité par cancer du côlon-rectum, calculé sur des périodes glissantes de trois ans, est représentée sur la figure 1 page 48 pour chacun des deux sexes.

Chez les hommes, le taux de mortalité par cancer du côlon-rectum oscille entre 35,0 et 42,2 pour 100 000 depuis le début des années 80 en Mayenne, sans qu'il soit possible de dégager une tendance évolutive. Sur ces deux décennies, le taux départemental est resté statistiquement non différent du taux national.

Chez les femmes en Mayenne, le taux de mortalité oscille entre 16,7 et 24,1 pour 100 000 depuis le début des années 80, sans qu'il soit possible de dégager une tendance évolutive. Au cours de ces deux décennies, le taux départemental est resté globalement inférieur au taux national, mais l'écart est le plus souvent statistiquement non significatif.

Dépistage organisé

- Le département de la Mayenne a été retenu en 2003 comme département pilote pour l'expérimentation du dépistage du cancer colo-rectal par recherche de sang dans les selles à l'aide du test Hémocult II. L'organisation de ce programme a été confiée à Camélia, structure de gestion départementale commune au dépistage organisé du cancer du sein, et la quasi-totalité des médecins généralistes de Mayenne ont accepté d'y participer.

Les personnes âgées de 50 à 74 ans, sont invitées à se rendre tous les deux ans chez un médecin généraliste participant au programme pour se faire remettre le test. Les personnes adressent ensuite elles-mêmes le test au centre de lecture Hémocult de l'Irsa de Tours à l'aide d'une enveloppe pré-affranchie. En cas de non-réponse, Camélia organise une première relance par courrier (4 à 5 mois après la première invitation), puis une seconde (environ 10 mois après), avec envoi du test par la poste.

La première campagne d'invitations s'est déroulée entre novembre 2003 et septembre 2005. Au mois de janvier 2006, la participation est donc provisoire dans la mesure où les relances n'ont pas toutes été adressées et où les dépistages n'ont pas tous été réalisés.

Néanmoins, les résultats sur la participation sont encourageants puisqu'en janvier 2006, 36 867 dépistages ont été réalisés. Si l'on rapporte cet effectif au nombre de personnes (hommes et femmes) de 50-74 ans résidant dans le département (estimé par l'Insee au 1er janvier 2004), cela correspond à un taux de participation de 49 %.