



3 - Le cancer du côlon-rectum dans les Pays de la Loire

données mises à jour :
juillet 2007

Tableau 1 - Admissions en affection de longue durée (1) - codes CIM10 : C18-C21

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nombre total d'admissions					1 345	1 491	1 577	1 639	1 635	1 698
Nombre d'admissions - Hommes					759	850	927	900	896	884
Nombre d'admissions - Femmes					586	641	650	739	739	814
Nombre d'admissions chez les 50-74 ans					768	796	837	858	882	928
Nombre d'admissions chez les 75 ans et plus					501	587	639	665	650	660

Tableau 2 - Incidence des cancers infiltrants - estimations quinquennales du réseau Francim

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nombre total de nouveaux cas estimés	1 849					2 066				
Nombre de nouveaux cas estimés - Hommes	1 015					1 146				
Nombre de nouveaux cas estimés - Femmes	834					920				
Taux d'incidence standardisé (2) - Hommes	39,8					41,7				
Taux d'incidence standardisé (2) - Femmes	23,7					24,2				

Tableau 3 - Mortalité - codes CIM9 : 153-154 ; CIM10 : C18-C21

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nombre total de décès	994	884	933	982	941	936	951	951	972	960
Nombre de décès - Hommes	541	444	498	550	524	486	535	543	526	549
Nombre de décès - Femmes	453	440	435	432	417	450	416	408	446	411
Taux moyen de mortalité standardisé (3) - Hommes	40,2	39,1	38,4	39,3	38,4	37,3	36,5	35,9		
Taux moyen de mortalité standardisé (3) - Femmes	21,6	21,5	21,0	20,3	20,0	19,3	18,9	18,6		


Sources : URCAM - DRSM Pays de la Loire, Francim, INSERM CépiDc, INSEE RP 90

Exploitation ORS

(1) données qui concernent les personnes protégées par le régime général, le régime agricole (MSA) et le régime des professions indépendantes (RSI)

(2) taux pour 100 000 habitants standardisé sur la population mondiale / (3) taux pour 100 000 habitants standardisé sur la population française, moyenne sur les 3 années n-1, n, n+1

Figure 1 - Evolution du taux de mortalité (3) par cancer colo-rectal dans les Pays de la Loire et en France métropolitaine depuis 1981



Sources : INSERM CépiDc, INSEE RP 90

Exploitation ORS

3 - Le cancer du côlon-rectum dans les Pays de la Loire

rédaction : mars 2006

Situation épidémiologique actuelle

- Les estimations régionales d'incidence du cancer, réalisées tous les cinq ans par le réseau national des registres des cancers Francim, font état d'environ 2 100 nouveaux cas de cancers colo-rectaux infiltrants diagnostiqués dans la population des Pays de la Loire en 2000 (tableau 2 page 42).
- Les statistiques d'admissions en affection de longue durée (ALD) pour cancer du côlon-rectum, établies par l'URCAM et la DRSM pour les trois principaux régimes d'assurance maladie, constituent une source d'information complémentaire sur l'incidence. Selon ces données, près de 1 500 personnes ont été admises en ALD pour cancer du côlon-rectum en 2000 dans les Pays de la Loire (tableau 1). Les trois principaux régimes couvrant environ 95 % de la population, le nombre d'admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum est donc nettement inférieur à l'incidence estimée par le réseau Francim. L'existence d'une autre maladie exonérante déjà reconnue chez les personnes atteintes d'un cancer du côlon-rectum, notamment chez les plus âgées, peut au moins en partie expliquer cette différence.
- Chez les personnes de 50 à 74 ans, tranche d'âge potentiellement concernée par le dépistage organisé, on dénombre 796 admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum en 2000, ce qui représente 53 % du nombre total de nouvelles admissions pour cette pathologie.
- Selon les statistiques annuelles de mortalité établies par l'Inserm CépiDc et disponibles jusqu'en 2002, le cancer du côlon-rectum a été responsable en moyenne chaque année de 946 décès sur la période 2000-2002 parmi les habitants de la région (tableau 3).

Tendances évolutives

- La région connaît comme la France une augmentation importante du nombre annuel estimé de nouveaux cas de cancers du côlon-rectum, qui est passé de 1 849 en 1995 à 2 066 en 2000, ce qui correspond à

une évolution annuelle moyenne de 2,2 % sur cette période. Cette progression résulte à la fois du vieillissement et de l'accroissement de la population, mais elle provient aussi d'une hausse du taux standardisé d'incidence (+0,9 % par an chez les hommes sur la période 1995-2000, +0,4 % chez les femmes).

Les données concernant les admissions en affection de longue durée pour cancer du côlon-rectum (disponibles jusqu'en 2003) montrent une augmentation de +5,0 % par an entre 1999 et 2003. Cette progression marquée des admissions en ALD sur les années récentes doit toutefois être interprétée avec prudence en raison du caractère médico-administratif de ces données. La mise en place en 2000 d'une nouvelle disposition tarifaire (majoration des honoraires pour les visites de patients de plus de 75 ans en ALD), a notamment pu inciter les praticiens à demander l'admission en ALD de certains patients n'en bénéficiant pas jusque-là, et contribuer ainsi à l'augmentation observée.

- L'évolution depuis le début des années 80 du taux standardisé de mortalité par cancer du côlon-rectum, calculé sur des périodes glissantes de trois ans, est représentée sur la figure 1 page 42 pour chacun des deux sexes.

Chez les hommes des Pays de la Loire, le taux de mortalité a suivi depuis le milieu des années 90 une tendance à la baisse (-1,6 % par an entre 1994 et 2001) comme le taux national (-1,8 %), tout en restant significativement supérieur à ce dernier. Sur la période 2000-2002, le taux régional est de 36,6 pour 100 000 (33,4 en France).

Chez les femmes de la région, le taux de mortalité a suivi depuis le début des années 80 la même tendance à la baisse que le taux national (-1,1 % par an), tout en restant proche de ce dernier.