


1 - Les cancers dans les Pays de la Loire

données mises à jour : juillet 2007

Principales localisations

Figure 1 - Nombre annuel moyen de décès par cancer en 2002-2004, nombre annuel moyen d'admissions en ALD en 2002-2004 et nombre de nouveaux cas estimé par Francim en 2000 selon la localisation dans les Pays de la Loire



Sources : INSERM CépiDc, URCAM - DRSM Pays de la Loire, Francim

Exploitation ORS

(1) admissions en affection de longue durée (ALD) concernant les personnes protégées par le régime général, le régime agricole (MSA) et le régime des professions indépendantes (RSI)

(2) VADS : voies aéro-digestives supérieures

1 - Les cancers dans les Pays de la Loire

rédaçtion : mars 2006

Pour les hommes

- Les quatre localisations cancéreuses les plus fréquentes - prostate, côlon-rectum, voies aéro-digestives supérieures et oesophage, poumon - représentent à elles seules environ 2 nouveaux cas de cancers masculins sur 3, que l'on considère les estimations de nouveaux cas de cancers réalisées par le réseau des registres des cancers Francim pour l'année 2000 (65 %), ou les données d'admissions en affection de longue durée pour cancer, établies par l'URCAM et la DRSM pour les trois principaux régimes d'assurance maladie sur la période 2001-2003 (64 %) (figure 1 page 12).

Ce sont aussi ces quatre localisations qui sont à l'origine du plus grand nombre de décès par cancer chez les hommes, représentant globalement 54 % de la mortalité liée à cette affection pour la période 2000-2002, selon les statistiques de mortalité établies par l'Inserm CépiDc.

- En matière d'incidence, si l'on considère les estimations Francim pour l'année 2000, le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers masculins. Il représente environ 29 % de l'ensemble des nouveaux cas estimés de cancers, devant le cancer des voies aéro-digestives supérieures et de l'oesophage (13 %), le cancer du côlon-rectum (13 %) et le cancer du poumon (11 %).

- En matière de mortalité, le cancer du poumon est le cancer à l'origine du plus grand nombre de décès masculins. Pour la période 2000-2002, il représente 19 % des décès masculins par cancer, devant le cancer de la prostate (11 %), les cancers des voies aéro-digestives supérieures et de l'oesophage (11 %), et le cancer du côlon-rectum (10 %).

Pour les femmes

- Le cancer du sein et le cancer colo-rectal sont les cancers dont l'incidence et la mortalité sont les plus élevées chez les femmes. Ces deux localisations représentent ainsi plus de la moitié du nombre

de nouveaux cas que l'on considère les estimations de nouveaux cas de cancers réalisées par le réseau des registres des cancers Francim pour l'année 2000 (38 % pour le cancer du sein et 14 % pour le cancer colo-rectal) ou les données d'admissions en affection de longue durée pour cancer, établies par l'URCAM et la DRSM pour les trois principaux régimes d'assurance maladie sur la période 2001-2003 (respectivement 43 % et 11 %).

Selon les statistiques de mortalité établies par l'Inserm CépiDc pour la période 2000-2002, le cancer du sein et le cancer colo-rectal représentent globalement un tiers de la mortalité féminine liée au cancer (respectivement 20 % et 14 %).

- Le cancer de l'utérus (col et corps) arrive au 3ème rang pour l'incidence (377 cas estimés en 2000, 144 cancers du col et 233 cancers du corps), mais seulement au 6ème pour la mortalité, en raison de son pronostic relativement favorable.

- La situation est inverse pour le cancer du poumon, qui arrive au 6ème rang pour l'incidence mais qui, en raison de sa gravité, constitue la localisation cancéreuse à l'origine du plus grand nombre de décès après le sein et le côlon-rectum (3ème rang).