

## HOMMES MOYENNE de 2000 à 2003 : Incidence par tranche d'âge quinquennal et taux d'incidence observés dans la population ligérienne

HOMMES		NOMBRE DE NOUVEAUX CAS PAR TRANCHE D'AGE																		TAUX			
Cancers libellé CIM10	Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-85	85+	Tx inc. brut	Tx cum. 0-64 ans	Tx inc. std.	Fréq. relat.
Cavité buccale	116	.	.	.	.	0	0	0	1	8	15	24	16	11	11	11	9	3	5	20,6	1,16	1,7	15,1
Pharynx et hypopharynx	115	.	.	0	.	.	.	.	2	7	15	21	16	13	14	14	10	2	1	20,5	1,13	1,82	15
Œsophage	95	.	.	.	.	.	.	.	1	2	7	10	13	14	15	12	12	7	3	16,9	0,78	1,42	11,8
Estomac	77	.	.	.	.	.	0	0	1	2	3	6	6	8	10	13	15	8	6	13,8	0,44	0,99	8,7
Intestin grêle	15	.	.	.	0	.	.	1	0	0	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2,7	0,11	0,18	1,8
Colon, jonction, rectum	353	.	.	.	.	1	1	2	3	7	11	27	31	32	58	62	57	40	22	62,8	1,89	4,84	40,2
Foie et v. bil. intra hép.	139	.	.	0	.	.	1	0	1	1	4	8	16	21	25	30	24	7	2	24,6	0,94	2,28	16,8
Vésicule et v. bil. extra hép.	11	.	.	.	.	.	.	0	.	.	0	1	.	2	1	2	2	2	1	2	0,07	0,16	1,3
Pancréas	36	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	2	4	6	9	6	4	2	1	6,5	0,27	0,64	4,7
Fosses nasales, oreille moy.	11	.	.	.	.	0	.	.	1	.	1	1	2	1	3	2	1	1	.	2	0,08	0,18	1,4
Larynx	93	.	.	.	.	.	.	.	0	6	9	14	15	11	11	11	10	3	2	16,6	0,9	1,45	12
Trachée, bronches, poumons	340	.	.	.	.	.	1	1	5	8	27	52	46	47	49	35	17	5	5	60,5	3,01	5,41	43,2
Org. respiratoires ou intrathor.	6	.	.	.	0	0	.	1	1	1	.	1	1	.	1	1	1	1	1	1,1	0,04	0,07	0,8
Os et cartilages articulaires	5	0	0	1	1	.	.	.	0	.	.	0	0	0	1	1	.	.	0	0,8	0,05	0,08	0,9
Mélanomes de la peau	79	0	.	.	.	1	3	2	3	7	7	8	7	8	8	9	8	5	4	14,1	0,68	1,09	10,2
Peau, autres	4	.	.	.	.	.	0	0	.	.	0	.	1	0	0	1	1	1	.	0,7	0,03	0,06	0,5
Mésothéliomes	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	5	5	3	2	2	3,8	0,1	0,34	2,5
Sarcome Kaposi gang. Lymph.	3	.	.	.	.	.	.	.	0	.	0	.	0	0	.	1	1	.	.	0,5	0,02	0,05	0,3
Péritoine et rétropéritoine	18	1	0	0	0	1	.	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	3,2	0,16	0,23	2,4
Sein	7	.	.	.	.	.	.	0	0	.	0	1	1	.	1	1	1	1	1	1,2	0,04	0,09	0,8
Prostate	1031	.	.	.	0	.	.	.	0	.	6	29	85	152	210	235	172	90	52	183,4	5,31	16,22	119,6
Testicule	38	.	.	.	2	5	6	7	7	4	3	2	2	1	0	0	0	.	.	6,7	0,47	0,48	6,1
Org. gén. masculins, autres	5	.	.	.	.	.	0	.	0	.	.	0	1	1	0	1	1	1	1	0,9	0,04	0,07	0,7
Vessie	102	.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	8	7	11	17	20	16	11	9	18,2	0,52	1,41	11,5
Reins et autres voies urinaires	103	1	1	.	.	0	.	1	1	2	5	14	10	14	19	14	14	6	3	18,4	0,78	1,57	13
Œil	7	1	.	.	.	0	.	0	1	.	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1,2	0,07	0,09	1,1
Méninges, cerveau, moelle	38	1	1	0	1	1	2	1	2	3	3	4	4	4	6	3	2	1	.	6,8	0,39	0,61	5,6
Thyroïde	22	.	.	0	.	1	2	2	2	3	3	1	3	1	1	2	1	.	.	3,9	0,25	0,32	3,2
Autres glandes endocrines	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	1	.	.	0	.	.	0,4	0,03	0,03	0,5
Maladie de Hodgkin	21	.	.	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	0	3,7	0,22	0,26	3
Lymph. non hodgkinien	117	1	1	1	1	1	1	4	3	6	6	10	8	13	14	16	18	10	8	20,8	0,82	1,55	14,4
Myélome multiple	26	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	4	3	3	4	5	2	1	4,6	0,19	0,37	3,1
Leucémies	109	4	2	1	2	2	2	1	3	2	2	10	9	8	15	15	14	10	9	19,4	0,71	1,43	14,1
Macroglob. de W., T. lymph	24	.	.	.	.	.	.	.	0	1	1	1	2	2	3	6	5	3	2	4,3	0,12	0,34	2,7
Autres hématologies	20	.	.	.	.	0	.	.	1	.	0	1	2	2	2	1	5	2	3	3,5	0,1	0,19	2,2
Siège primitif inconnu	118	.	.	.	0	0	0	1	1	4	7	10	11	13	18	20	19	9	6	21	0,78	1,71	14,2
Autres	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	.	.	0,1	.	0,01	0
<b>TOTAL</b>	<b>3322</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>76</b>	<b>146</b>	<b>268</b>	<b>327</b>	<b>409</b>	<b>534</b>	<b>571</b>	<b>468</b>	<b>250</b>	<b>151</b>	<b>591,3</b>	<b>22,49</b>	<b>49,52</b>	<b>403,8</b>

Tx inc. brut : taux d'incidence brut, exprimé en nombre de cas pour 100 000 habitants

Tx cum. 0-64 ans : Taux d'incidence cumulé de 0 à 64 ans, exprimé en pourcentage

Tx inc. std. : taux d'incidence standardisé selon le modèle mondial, exprimé en nombre de cas pour 100 000 habitants

Fréq. relat. : fréquence relative du taux d'incidence standardisé, exprimé en pourcentage

Les carcinomes basocellulaires sont exclus de la peau.