

MOYENNE LOIRE-ATL. 1998 à 2002 : INCIDENCE, fréquences relatives, taux d'incidence brut et taux standardisé résumés par appareil et par sexe

APPAREIL (CIM10)	FEMMES					HOMMES				
	Effectifs	Taux incidence brut	Taux std selon pop. europ.	Taux std selon pop. mond.	Fréquence relative %	Effectifs	Taux incidence brut	Taux std selon pop. europ.	Taux std selon pop. mond.	Fréquence relative %
Bouche, pharynx	41	7,0	5,8	4,2	1,7%	236	43,0	44,9	32,5	8,3%
Appareil digestif	420	71,8	52,6	35,2	14,5%	707	128,9	129,7	87,5	22,4%
Appareil respiratoire et thorax	81	13,8	12,0	8,7	3,6%	414	75,5	78,5	55,6	14,2%
Os et cartilages articulaires	5	0,8	0,6	0,6	0,2%	4	0,7	0,7	0,6	0,2%
Peau	103	17,7	16,0	12,3	5,0%	78	14,2	14,3	10,4	2,7%
Tissus mous et conjonctifs	21	3,6	3,0	2,3	1,0%	39	7,0	7,1	4,9	1,2%
Sein	860	147,1	137,7	101,3	41,7%	7	1,2	1,3	0,9	0,2%
Organes génitaux féminins	218	37,3	32,7	23,7	9,8%					
Organes génitaux masculins						904	164,8	162,4	108,3	27,7%
Appareil urinaire	80	13,8	10,7	7,7	3,2%	203	37,0	37,4	25,4	6,5%
Œil, système nerveux central	32	5,5	5,3	4,3	1,8%	42	7,7	8,1	6,6	1,7%
Glandes endocrines	83	14,1	14,0	11,4	4,7%	23	4,2	4,3	3,6	0,9%
Hémopathies malignes	223	38,1	31,0	23,3	9,6%	283	51,6	51,7	37,3	9,5%
Site primitif incertain	85	14,6	11,5	8,0	3,3%	137	24,9	25,3	17,6	4,5%
TOUS APPAREILS	2 252	385,2	333,1	242,9	100,0%	3 077	560,8	565,6	391,3	100,0%

Taux std selon pop. mond. : Taux standardisé selon le modèle mondial

Taux std selon pop. europ. : Taux standardisé selon le modèle européen

Taux exprimés en nombre de cas observés pour 100 000 habitants

Les carcinomes basocellulaires sont exclus de la pe